



# AVERTISSEMENTS AGRICOLES TELEIMPRIMES

003 00089 0292A 00 221020 04503

CNEPS  
BIBLIOTHEQUE NATIONALE  
DEPARTEMENT DES PERIODIQUES  
56 RUE DE RICHELIEU

75084 PARIS CEDEX 02

DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET  
SERVICE REGIONAL  
DE LA PROTECTION DES VEGETAUX  
280, RUE DE FOUGERES BP 67128 35067 RENNES CEDEX

## EDITION CULTURES LEGUMIERES

BULLETIN N°198

RENNES LE 22 OCTOBRE 1990

### CHOUX

Dans le Nord Finistère, la prolifération des pucerons cendrés et des noctuelles s'accroît sur chou-fleur, chou pommé et chou de Bruxelles. Les attaques de piérides sont également importantes. Les dégâts constatés sont souvent sévères, y compris dans les parcelles qui ont déjà reçu des traitements. La proximité de parcelles de colza et de choux fourragers non traités favorise de plus les contaminations.

Dans la région de Saint Malo, les attaques de pucerons cendrés sont également en recrudescence sur chou-fleur et chou pommé avec des dégâts importants, même dans les parcelles traitées. Par contre, les attaques de noctuelles et de piérides se font plus rares.

Une intervention est à effectuer très rapidement sur puceron cendré dans ces 2 régions. Elle visera également les noctuelles et les piérides lorsqu'elles sont présentes. Pensez à traiter également les parcelles de colza oléagineux qui sont envahies par les pucerons cendrés.

Les traitements insecticides efficaces, utilisables sur choux, contre les pucerons cendrés, les noctuelles et les piérides sont:

- le diméthoate associé à une pyréthrianoïde de synthèse
- le KARATE K
- le PIRIMOR associé à une pyréthrianoïde de synthèse
- le DECIS B qui peut s'utiliser dans le cas de plantations d'artichaut en intercalaire ou de récolte prochaine de chou-fleur d'automne. Un délai d'intervention de 3 jours avant récolte est à respecter.
- le CRONETON associé à une pyréthrianoïde de synthèse. Le mélange est possible sans restriction avec BAYTHROID. Pour les autres pyréthrianoïdes de synthèse, vérifier au préalable la compatibilité physique avec CRONETON en faisant un test dans un seau.

Les traitements visant les noctuelles doivent être réalisés le soir avec un fort volume d'eau par ha.

Le PIRIMOR et le KARATE K doivent s'employer par température supérieure ou égale à 15°C, l'après-midi de préférence.

756

## POIREAU

Dans la région de Saint Malo, une certaine recrudescence des attaques de la rouille du poireau est observée dans les cultures. Par ailleurs, les conditions climatiques sont favorables à cette maladie sur l'ensemble de la Bretagne.

**Pensez à renouveler le traitement contre la rouille.**

L'ANTRACOL bénéficie d'une autorisation de vente. BAYTAN, ETENDARD, ANVIL et TILT SP sont efficaces.